

PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN.


Bayfidan[®] 250 EC

Postřikový systémový fungicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu k ochraně pšenice a ječmene proti houbovým chorobám a chmele proti padlí.

Účinná látka:

triadimenol 250 g/l

t.j. (RS)-1-(4-chlorfenoxy)-3,3-dimethyl-1-(1-H-1,2,4-triazol-1-yl)-butan-2-ol

	<p>Zdraví škodlivý při požití Pro včely relativně neškodný, při dodržení předepsané dávky nebo koncentrace Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí Hořlavina III. třídy Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí.</p>
---	---

Balení: COEX HDPE/PA kanystř
Hmotnost - obsah: 5 l

Registrační číslo: 3600-1

Datum výroby: uvedeno na obalu
Číslo šarže: uvedeno na obalu

Držitel rozhodnutí o registraci/výrobce: Bayer CropScience AG, Monheim, SRN

Právní zástupce v ČR: Bayer s. r. o., Litvínovská 609/3, 190 21 Praha 9

[®] je registrovaná ochranná známka společnosti Bayer CropScience AG

Doba použitelnosti přípravku: 2 roky od data výroby při skladování v originálních neotevřených obalech a dodržení podmínek skladování.

Působení:

Bayfidan[®] 250 EC je systémově působící přípravek s účinnou látkou ze skupiny triazolů. Vyznačuje se účinkem proti širokému spektru houbových chorob, zejména proti padlím.

Návod k použití:

plodina	škodlivý činitel	dávka	ochranná lhůta	poznámka
pšenice	padlí, rzi	0,5 l/ha	Před květem	max. 2 ošetření
ječmen	padlí, rzi	0,5 l/ha	Před květem	max. 1 ošetření
chmel	padlí chmelové	0,05 %	14 dní	max. 4 ošetření, 1 000 - 3 000 l vody/ha

Upřesnění podmínek aplikace:

Pšenice, ječmen:

Ošetření provádíme od počátku napadení ev. při zjištění prvních symptomů, nejpozději před květem.

Chmel:

Ošetření provádíme nejpozději při prvních výskytech choroby v intervalu 7-14 dní, v závislosti na průběhu počasí a síle infekčního tlaku škodlivého činitele. Množství postřikové kapaliny je nutno přizpůsobit vývojovému stádiu chmele (výška rostlin a objem zelené hmoty) v době aplikace.

Příprava postřikové kapaliny:

Odměřené množství přípravku vlijte do nádrže postřikovače naplněného do poloviny vodou. Po rozmíchání doplňte vodou na předepsaný objem.

Bezpečnostní opatření pro ochranu člověka a zvířat, první pomoc:

Před použitím přípravku důkladně přečtěte návod k použití !

Nejezte, nepijte a nekuřte při práci

Zamezte styku s očima

Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít

Při práci s přípravkem Bayfidan 250 EC použijte ochranný oděv proti chemikáliím z plastu nebo nánosované tkaniny s kapucí (např. Ochranný oblek SUNIT typ IV A, typ VA, Ochranná kombinéza proti chemikáliím s kapucí typ OK 329, typ OK 230, případně jiný schválený ekvivalent), obličejový štít Š-P15 + Polomaska PROTETIKA typ RU-20 s vložkovým filtrem A1, Filtrační polomaska 3M série 6000 s filtrem proti částečným 3M typ 2135, případně jiné schválené ekvivalenty, ochranné rukavice z plastu nebo pryže a pryžové holínky. Při ředění postřiku použijte navíc zástěru z plastu či pogumovaného textilu.

Při práci a po jejím skončení až do vyslečení pracovního oděvu a důkladného umytí mýdlem a teplou vodou je zakázáno jíst, pít a kouřit. Postřik se smí provádět pouze za bezvětří či mírného vánku, vždy ve směru větru od pracujících.

Postřik nesmí zasáhnout sousední necílové kultury.

Přípravek je hořlavou kapalinou III. třídy nebezpečnosti. Eventuální požár se hasí nejlépe hasební pěnou, hasebním práškem, případně pískem nebo zeminou. Vodu lze použít jen výjimečně, a to formou jemného zmlžování, nikoliv silným proudem a pouze v těch případech, kdy je dokonale zabezpečeno, aby kontaminovaná hasební voda nemohla uniknout z prostoru požářiště do okolí a zvláště aby nemohla proniknout do veřejné kanalizace, zdrojů spodních vod ani recipientů povrchových vod a nemohla zasáhnout zemědělskou půdu.

Důležité upozornění:

Při požárním zásahu musejí být použity izolační dýchací přístroje, neboť při hoření může docházet ke vzniku toxických zplodin!

První pomoc:

Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte etiketu

Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc

Při styku s kůží omyjte velkým množstvím vody

Při nadýchání - okamžitě přerušit práci, opustit zamořený prostor, odstranit potřísněný oděv, zajistit klidovou polohu a ochranu před chladem

Při zasažení pokožky - odstranit potřísněný oděv, zasažená místa důkladně omýt teplou vodou a mýdlem

Při zasažení očí - nepro ným množstvím vody, vyhledat lékařskou pomoc

Při požití - v případě náhodného požití podat postiženému dle vyhláchnout dostateč 10 tablet aktivního uhlí + 0,5 litru vlažné vody a postiženého neprodleně dopravit k lékaři.

Lékaře vždy informovat o přípravku, se kterým postižený pracoval a o poskytnuté první pomoci. Terapii lze konzultovat s toxikologickým informačním střediskem: Klinika nemocí z povolání - Toxikologické informační středisko, Na bojišti 1, 128 08 Praha 2, (+420) 224 919 293.

Skladování přípravku:

Uchovávejte mimo dosah dětí

Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv

Přípravek skladujte v suchých uzamykatelných skladech, v uzavřených originálních obalech při teplotách 5 - 30 °C odděleně od potravin, krmiv, hnojiv, desinfekčních prostředků a obalů od těchto látek. Chraňte před mrazem, vlhkem a přímým slunečním svitem.

Způsob likvidace obalu, neupotřebitelných zbytků, postřikové kapaliny a oplachových vod:

Případné zbytky postřikové kapaliny a oplachové vody se vylíjí do mělké brázdy na ošetřovaném pozemku, a to tak, aby nebyly zasaženy zdroje podzemních a recipienty povrchových vod. Prázdné obaly od přípravku se spálí ve schválené spalovně, vybavené dvoustupňovým spalováním s teplotou ve 2. stupni 1200 - 1400 °C a čištěním plynných zplodin. Případné nepoužité zbytky přípravku se po smísení s pilinami spálí ve spalovně stejných parametrů jako pro obaly.

V případě jakékoliv eventuelní nehody či havárie, týkající se přípravku se, prosím, obraťte na adresu:

*Bayer s. r. o., Litvínovská 609/3, Praha 9 - Prosek
Tel.: (+420) 266 101 842; (+420) 266 101 844 fax (+420) 266 101 494*

V případě nezbytné potřeby a naší eventuelní nedostupnosti na výše uvedené adrese obraťte se, prosím na naši 24-hodinovou kontaktní službu:

*Bayer CropScience AG, Dormagen, Německo
Tel. +49 214 30 99300*

Dodatková informace společnosti Bayer CropScience:

*Přípravek používejte výhradně v souladu s návodem na použití.
Společnost Bayer nepřebírá zodpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím či skladováním přípravku.*