Přípravek na ochranu rostlin

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE PŘILOŽENÝ NÁVOD K POUŽITÍ.

ZETROLA®

Herbicid ve formě emulgovatelného koncentrátu určený k post-emergentnímu hubení jednoděložných jednoletých a vytrvalých plevelů v cukrovce, bramboru, lnu, hrachu, řepce ozimé i jarní, jeteli, vojtěšce, jahodníku, cibuli, zelí, mrkvi, slunečnici, bobu, pelušce, svazence, jádrovinách, broskvoních, lesních kulturách, lesních školkách a ředkvi olejné určené pro produkci osiva pro strniskové směsky na zelené hnojení. Dále k hubení pýrů plazivého, vytrvalých trav, plevelů lipnicovitých jednoletých i vytrvalých, výdrolu obilnin ve vikvi seté, slézu přeslenitém, tolici dětelové, komonici, pískavici řecké seno, úročníku lékařském, štírovníku růžkatém, čičorce pestré, vičenci ligrus, jetelu plazivém, zvrhlém, panonském, perském, alexandrijském, prostředním, cizrně beraní, hrachoru setém, hořčici sareptské, jeteli bledožlutém, hybridu jetele lučního a jetele prostředního (odrůda Pramedi), svazence shloučené, lničce seté, katránu etiopském, ředkvi, ředkvičce, petrželi kořenové, celeru bulvovém, pastináku, brokolici, květáku a hořčici.

Kategorie uživatelů:

Pouze pro profesionální uživatele.

Název a množství účinné látky:
propachizafop 100 g/l (9-11%)

Označení přípravku:

Nebezpečí

H304	Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H319	Způsobuje vážné podráždění očí.
H411	Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102	Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280	Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338	PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P331	NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P501	Odstraňte obsah/obal v souladu s platnými předpisy tak, aby nedošlo k ohrožení životního prostředí.
SP 1	Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest).

EUH401	Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
EUH208	Obsahuje propachizafop. Může vyvolat alergickou reakci.
EUH066	Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Držitel rozhodnutí o povolení / Osoba odpovědná za konečné balení a označení nebo za konečné označení přípravku na ochranu rostlin na trhu: ADAMA Agriculture Solutions Ltd., Golan Street, Airport City, 70151 Izrael
Právní zástupce v ČR: Adama CZ s. r.o., Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany, tel: 241 930 644

Evidenční číslo přípravku: **4239-13**
Číslo šarže: uvedeno na obalu
Datum výroby formulace: uvedeno na obalu
2D kód: uvedeno na obalu
Doba použitelnosti přípravku: 2 roky od data výroby
Množství přípravku v obalu: 1 l v HDPE nebo HDPE/PA nebo F-HDPE láhvi
5 l, 10 l a 20 l v HDPE/PA nebo F-HDPE kanystru
200 l v ocelové sudu

Způsob působení:

Přípravek Zetrola působí selektivně jako listový translokační herbicid proti jednoděložným jednoletým a vytrvalým plevelům a výdrolu obilnin. Zetrola se aplikuje až na vzešlé plevele postemergentně, takže je možné ošetřovat výběrově ohniska zaplevelených částí pozemků. Herbicidní účinek je pozorovatelný po 10 dnech po aplikaci.

Rozsah povoleného použití:

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL (dny)	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
jádroviny, peckoviny (pouze broskvoně), brambory, mrkev, cibule, zelí	plevele lipnicovité jednoleté	0,5–0,8 l/ha	30	1) postemergentně 2) od: 13 BBCH, do: 29 BBCH	
	pýr plazivý	1,2–1,5 l/ha	30	1) postemergentně 2) od: 13 BBCH, do: 29 BBCH	
jetel, vojtěška, bob, peluška, hrách	plevele lipnicovité jednoleté	0,5–0,8 l/ha	45	1) postemergentně 2) od: 13 BBCH, do: 29 BBCH	
	pýr plazivý	1,2–1,5 l/ha	45	1) postemergentně 2) od: 13 BBCH, do: 29 BBCH	
hrách cukrový, hrách dřeňový	plevele lipnicovité jednoleté	0,5–0,8 l/ha	40	1) postemergentně 2) od: 13 BBCH, do: 29 BBCH	
	pýr plazivý	1,2–1,5 l/ha	40	1) postemergentně 2) od: 13 BBCH, do: 29 BBCH	

řepka olejka, slunečnice roční	plevele lipnicovité jednoleté	0,5–0,8 l/ha	90	1) postemergentně 2) od: 13 BBCH, do: 29 BBCH	
	pýr plazivý	1,2–1,5 l/ha	90	1) postemergentně 2) od: 13 BBCH, do: 29 BBCH	
řepka olejka jarní	výdrol obilnin	0,5 l/ha	90	1) postemergentně 2) od: 13 BBCH, do: 21 BBCH	
řepka olejka ozimá	výdrol obilnin	0,4-0,5 l/ha	90	1) postemergentně 2) od: 13 BBCH, do: 21 BBCH	
len	plevele lipnicovité jednoleté	0,5–0,8 l/ha	100 - 110	1) postemergentně 2) od: 13 BBCH, do: 29 BBCH	
	pýr plazivý	1,2–1,5 l/ha	100 - 110	1) postemergentně 2) od: 13 BBCH, do: 29 BBCH	
jahodník	plevele lipnicovité jednoleté	0,5–0,8 l/ha	35	1) postemergentně 2) od: 13 BBCH, do: 29 BBCH	
	pýr plazivý	1,2–1,5 l/ha	35	1) postemergentně 2) od: 13 BBCH, do: 29 BBCH	
cukrovka	plevele lipnicovité jednoleté	0,5–0,8 l/ha	60	1) postemergentně 2) od: 13 BBCH, do: 29 BBCH	
	pýr plazivý	1,2–1,5 l/ha	60	1) postemergentně 2) od: 13 BBCH, do: 29 BBCH	
svazenka vratičolistá	plevele lipnicovité jednoleté	0,5–0,8 l/ha	AT	1) postemergentně 2) od: 13 BBCH, do: 29 BBCH	
	pýr plazivý	1,2–1,5 l/ha	AT	1) postemergentně 2) od: 13 BBCH, do: 29 BBCH	
lesní kultury	plevele lipnicovité, třtina křovištní	1-2 l/ha	AT	1) postemergentně 2) od: 12 BBCH, do: 13 BBCH	
lesní kultury	třtina křovištní, retardace	1-1,5 l/ha	AT	1) postemergentně 2) od: 12 BBCH, do: 13 BBCH	
lesní školky	plevele lipnicovité jednoleté	0,5–0,8 l/ha	AT	1) postemergentně 2) od: 13 BBCH, do: 29 BBCH	
lesní školky	pýr plazivý	1,2–1,5 l/ha	AT	1) postemergentně 2) od: 13 BBCH,	

				do: 29 BBCH	

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem aplikace a sklizní.
AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití	**Dávka vody**	**Způsob aplikace**	**Maximální počet aplikací v plodině**
jádroviny, peckoviny, jahodník, jetel, vojtěška, lesní kultury, lesní školky	100 – 400 l/ha	postřik	1 x / rok
bob, brambor, cibule, cukrovka, hrách cukrový, hrách dřeňový, len, mrkev, peluška, řepka olejka, slunečnice, svazenka vratičolistá, zelí	100 – 400 l/ha	postřik	1 x

Upřesnění použití:

Přípravek se aplikuje na vzešlé plevele postemergentně.
Pýr plazivý, čirok halepský a ostatní víceleté lipnicovité plevele jsou nejcitlivější od fáze 3. listu do konce odnožování (BBCH 13-29), tj. pýr plazivý při výšce cca 15-25 cm, čirok halepský cca 30-40 cm.
Ježatka kuří noha, béry, prosa, chundelka metlice a ostatní jednoleté lipnicovité plevele se ošetřují ve fázi od 3. listu do konce odnožování (BBCH 13-29). Nejcitlivější jsou od fáze 3. listu do začátku odnožování. Raná vývojová stádia plevelů jsou citlivější.
Výdrol obilnin je nejcitlivější od fáze 3 listů až do počátku odnožování.
Zejména při hubení pýru plazivého se musí po aplikaci zachovat kultivační klid minimálně 3 týdny, aby došlo k dokonalé translokaci účinné látky do oddenků pýru.
V lesních kulturách se ZETROLA použije proti třtině křovištní na jaře ve stádiu 2-3 listů třtiny (15-22 cm). Dávky kolem 1 l/ha je možné aplikovat na lehčích půdách, dávky do 2 l/ha na půdách těžších.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty! Obzvláště citlivé jsou obilniny a trávy.

Opatření k minimalizaci pravděpodobnosti vývoje rezistence:
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku ze skupiny ACCase inhibitorů, po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanismem účinku.

Ochranné vzdálenosti a jiná opatření a omezení s ohledem na ochranu zdraví lidí, necílových organismů a složek životního prostředí:

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:

Plodina	bez redukce	tryska 50 %	tryska 75 %	tryska 90 %
Ochranná vzdálenost vzhledem k povrchové vodě s ohledem na ochranu vodních organismů (m)				
jádroviny, peckoviny, lesní školky a kultury, brambor, mrkev, zelí, jahody, cibule, řepka, jetel, vojtěška, svazenka, slunečnice, cukrovka, bob, peluška, hrách	4	4	4	4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]				
lesní kultury	5	0	0	0

Další omezení:

Přípravu aplikační kapaliny (postřikové jíchy) provádějte ve venkovních prostorách s dostatečným přísunem čerstvého vzduchu.
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob.
Vstup na ošetřeného pozemky je možný nejdříve druhý den po aplikaci.
Při přípravě aplikační kapaliny ani při provádění postřiku nepoužívejte kontaktní čočky.
Práce s přípravkem je zakázaná pro těhotné a kojící ženy a pro mladistvé.

Při ošetřování lesních porostů v oblastech využívaných širokou veřejností nebo zranitelnými skupinami obyvatel je nutné dodržet následující preventivní a režimová opatření:
- aplikaci je nutno předem oznámit (např. místně příslušnému obecnímu nebo městskému úřadu);
- vlastník pozemku nebo osoba/firma provádějící aplikaci musí zajistit vhodné označení ošetřené plochy nebo stromů (během a po dobu 3 dní po aplikaci) například nápisem: „chemicky ošetřeno, nedotýkejte se ošetřených porostů“ s doplněním časových termínů.

Příprava aplikační kapaliny:

Uvedeno v bodu: „Další údaje a upřesnění“

Čištění zařízení pro aplikaci přípravku:

Uvedeno v bodu: „Další údaje a upřesnění“

Osobní ochranné pracovní prostředky:

Uvedeno v bodu: „Další údaje a upřesnění“

Informace o první pomoci:

Všeobecné pokyny:
Projeví-li se přetrvávající zdravotní potíže (slzení, zarudnutí, pálení očí; podráždění kůže nebo podezření na alergickou reakci, bolesti hlav; nevolnost apod.) nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace ze štítku, příbalového letáku nebo bezpečnostního listu.

První pomoc při nadýchání aerosolu při aplikaci:
Přerušte práci. Přejděte mimo ošetřovanou oblast. Zajistěte tělesný a duševní klid.

První pomoc při zasažení kůže:
Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem, pokožku následně dobře opláchněte.

První pomoc při zasažení očí:
Nejdříve odstraňte kontaktní čočky, pokud je používáte, současně vyplachujte prostor pod víčky po dobu alespoň 15 minut velkým množstvím vlahé tekoucí čisté vody. Kontaktní čočky nelze znovu použít, je třeba je zlikvidovat.

První pomoc při náhodném požití:
Ústa vypláchněte vodou; nikdy nevyvolávejte zvracení.

Při vyhledání lékařského pomoci informujte o přípravku, se kterým postižený pracoval, a o poskytnuté první pomoci. Další postup první pomoci lze konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: Telefon nepřetržitě 224 919 293 nebo 224 915 402.

Skladování:

Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech v uzamčených, suchých a větratelných skladech při teplotách od +5 ºC do +35 °C odděleně od potravin, nápojů, krmiv, hnojiv, dezinfekčních prostředků a obalů od těchto látek. Chránit před mrazem, vlhkem a přímým slunečním svitem.

Likvidace obalů a zbytků:

Případné zbytky oplachové kapaliny nebo postřikové jíchy se naředí v poměru 1:5 a vystříkají beze zbytku na ošetřenou plochu, nesmí však zasáhnout zdroje vod podzemních ani recipienty vod povrchových.
Prázdné obaly přípravku se po důkladném vypláchnutí a znehodnocení mohou předat do sběru k recyklaci, nebo se spálí ve schválené spalovně vybavené dvoustupňovým spalováním s teplotou 1200 až 1400 °C ve druhém stupni a s čištěním plynných zplodin.
Případné zbytky přípravku se po nasáknutí do hořlavého materiálu (piliny) spálí ve spalovně stejných parametrů jako pro obaly.
Zákaz opětovného použití obalu.

Další údaje a upřesnění:

Výrobce: ADAMA Agan Ltd., P.O.Box 262, Northern Industrial Zone, Ashdod 77102, Izrael
Distributor: Syngenta Czech s.r.o., Coral Office Park Nové Butovice Budova D, Bucharova 1314/8, 158 00, Praha 5, tel.: 222 090 411

Aplikace přípravku:
Přípravek Zetrola se aplikuje postřikem schválenými pozemními postřikovači, které zabezpečí rovnoměrné dávkování přípravku.
Přípravek není určen pro ruční aplikaci.
Výdrol obilnin je nejcitlivější od fáze 3 listů až do počátku odnožování. Při časnější aplikaci (1–2 listy) může dojít ke snížení účinku vlivem postupného vzcházení dalších rostlin výdrolu. Při pozdější aplikaci je již kulturní plodina (zejména řepka) výrazně oslabena a i přes herbicidní efekt může dojít k poškození porostu.
Zejména při hubení pýru plazivého se musí po aplikaci zachovat kultivační klid minimálně 3 týdny, aby došlo k dokonalé translokaci účinné látky do oddenků pýru. Ošetřené jednoděložné plevele přestanou růst během 3–4 dnů po aplikaci. Postupně se projevují příznaky chlorózy na mladších tkáních a následuje úplné hynutí celých rostlin během 10–20 dnů.
Při použití v lesním hospodářství působí Zetrola selektivně vůči všem běžně pěstovaným cílovým dřevinám.

Příprava aplikační kapaliny:
Odměřené množství přípravku se vlije do nádrže postřikovače naplněné do poloviny vodou, rozmíchá se a doplní vodou na předepsaný objem, nebo se použije přimíchávací zařízení. Připravte si takové množství postřikové kapaliny, které spotřebujete. Formulace přípravku Zetrola obsahuje smáčedlo. Do postřikové kapaliny již žádné smáčedlo nepřidávejte. Aplikační kapalinu připravujte bezprostředně před použitím a ihned spotřebujte.
Přípravu aplikační kapaliny (postřikové jíchy) provádějte ve venkovních prostorách s dostatečným přísunem čerstvého vzduchu.

Osobní ochranné pracovní prostředky:

Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

Osobní ochranné pracovní prostředky při přípravě a aplikaci	
Ochrana dýchacích orgánů	není nutná, je-li práce prováděna ve venkovních prostorách v uzavřených prostorách při ředění přípravku – vhodný typ filtrační polomasky proti plynům a částicím podle ČSN EN 405+A 1 nebo jiná ochranná polomaska/masky např. podle ČSN EN 136 nebo ČSN EN 140, s vhodnými filtry (např. filtry typ A) podle ČSN EN 143
Ochrana rukou	gumové nebo plastové rukavice označené piktogramem pro chemická nebezpečí podle ČSN EN 420+A1 s uvedeným kódem podle přílohy A k ČSN 374 -1
Ochrana očí a obličeje	při ředění přípravku - ochranné brýle nebo bezpečnostní ochranné brýle nebo ochranný štít podle ČSN EN 166 při vlastní aplikaci – není nutná
Ochrana těla	celkový ochranný oděv z textilního materiálu např. podle ČSN EN 14605+A1 nebo podle ČSN EN 13034+A1, popř. podle ČSN EN ISO 13982-1 nebo jiný ochranný oděv označený piktogramem „ochrana proti chemikáliím“ podle ČSN EN 340 resp. ČSN EN ISO 13688, popř. při ředění přípravku gumová nebo plastová zástěra
Dodatečná ochrana hlavy	není nutná
Dodatečná ochrana nohou	pracovní nebo ochranná obuv (např. gumové nebo plastové holinky) podle ČSN EN ISO 20346 nebo ČSN EN ISO 20347 (s ohledem na práci v zemědělském nebo lesnickém terénu)
Společný údaj k OOPP:	poškozené OOPP (např. protržené rukavice) je třeba urychleně vyměnit.

Je-li pracovník při vlastní aplikaci dostatečně chráněn v uzavřené kabině řidiče, OOPP nejsou nutné. Musí však mít přichystané alespoň rezervní rukavice pro případ poruchy zařízení.

Nejezte, nepijte a nekuřte při používání a rovněž po skončení práce, až do odložení ochranného/pracovního oděvu a dalších OOPP a do důkladného umytí. Pokud není používán ochranný oděv pro jedno použití, pak ochranný oděv a OOPP před dalším použitím vyperte resp. očistěte.
U textilních prostředků se při jejich praní/ošetřování/čistění řiďte piktogramy/symboly, umístěnými zpravidla na výrobku.

Rizika fytotoxicity:
Je-li přípravek Zetrola aplikován v souladu s platnou etiketou a návodem k použití, je vysoce tolerantní k ošetřovaným rostlinám.

Následné plodiny:
Následné plodiny lze v rámci normálního osevního postupu pěstovat bez omezení

Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí:
Přípravek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany ptáků, ostatních suchozemských obratlovců, včel, ostatních necílových členovců, půdních makroorganismů a mikroorganismů.

Čištění aplikačního zařízení:
1. úplně vyprázdněte aplikační zařízení na ošetřovaném pozemku
2. vyjměte všechny filtry a trysky a propláchněte je čistou vodou
3. naplňte aplikační zařízení do jedné čtvrtiny nebo do ponoření agitátoru vodou (v případě použití tank mixu s přípravky na bázi oleje lze přidat 0,5% detergent)

4. promíchejte nejméně jednu minutu a propláchněte skrz pumpu, pokud má aplikační zařízení systém čištění, použijte jej
5. výplachovou vodu zachyťte
6. proveďte propláchnutí ještě jednou
7. opláchněte aplikační zařízení z venkovní strany
8. výplachovou vodu naplňte do aplikačního zařízení a vystříkejte na ošetřeném pozemku nebo jiným způsobem bezpečně zlikvidujte

Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009

Rozsah povoleného použití:

1)Plodina, oblast použití	**2) Škodlivý organismus, jiný účel použití**	**Dávkování, mísitelnost**	**OL (dny)**	**Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL**	**4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně**
vikev setá	pýr plazivý	1,2-1,5 l/ha	45	1) postemergentně 2) ve f. na vzrostlý pýr 15-25 cm	
sléz přeslenitý, tolice dětelová, komonice, pískavice řecké seno, úročník lékařský, štírovník růžkatý, štírovník jednoletý, čičorka pestrá, vičenec ligrus, jetel plazivý, jetel zvrhlý, jetel panonský, jetel perský, jetel alexandrijský, jetel inkarnát, jetel prostřední	Plevele lipnicovité jednoleté	0,5 – 0,8 l/ha	45	1) Postemergentně 2) do: 19 BBCH	
sléz přeslenitý, tolice dětelová, komonice, pískavice řecké seno, úročník lékařský, štírovník růžkatý, štírovník jednoletý, čičorka pestrá, vičenec ligrus, jetel plazivý, jetel zvrhlý, jetel panonský, jetel perský, jetel alexandrijský, jetel inkarnát, jetel prostřední	Pýr plazivý a vytrvalé trávy	1,2 – 1,5 l/ha	45	1) Postemergentně 2) do: 29 BBCH	
cizrna beraní, hrachor setý	plevele lipnicovité jednoleté	0,5 – 0,8 l/ha	40	1)postemergentně 2) do: 19 BBCH	
cizrna beraní, hrachor setý	pýr plazivý a vytrvalé trávy	1,2 – 1,5 l/ha	40	1)postemergentně 2) do: 29 BBCH	

pískavice řecké seno	plevele lipnicovité jednoleté	0,5 – 0,8 l/ha	AT	1)postemergentně 2) do: 19 BBCH	6) množitelské porosty
pískavice řecké seno	pýr plazivý a vytrvalé trávy	1,2 – 1,5 l/ha	AT	1)postemergentně 2) do: 29 BBCH	6) množitelské porosty
hořčice sareptská	pýr plazivý	1,2 – 1,5 l/ha	AT	1)postemergentně 2) od: 13 BBCH do: 29 BBCH	6) množitelské porosty
hořčice sareptská	plevele lipnicovité jednoleté	0,5 – 0,8 l/ha	AT	1)postemergentně 2) od: 13 BBCH do: 29 BBCH	6) množitelské porosty
jetel zvrhlý, jetel perský, jetel panonský, jetel bleděžlutý, hybrid jetele lučního a jetele prostředního (odrůda Pramedi), vičenec ligrus, tolice dětelová, komonice	plevele lipnicovité jednoleté, výdrol obilnin	0,4 – 0,8 l/ha	45	1)postemergentně 2) od: 13 BBCH do: 29 BBCH	4) aplikace dělená max. 1,5 l/ha za sezónu
jetel zvrhlý, jetel perský, jetel panonský, jetel bleděžlutý, hybrid jetele lučního a jetele prostředního (odrůda Pramedi), vičenec ligrus, tolice dětelová, komonice	pýr plazivý, plevele lipnicovíté vytrvalé	1,2 – 1,5 l/ha	45	1)postemergentně 2) od:13 BBCH do: 29 BBCH	4) aplikace dělená max. 1,5 l/ha za sezónu
pískavice řecké seno, lnička setá, katrán etiopský	pýr plazivý, plevele lipnicovité vytrvalé	1,2 – 1,5 l/ha	AT	1)postemergentně 2)od: 13 BBCH, do:29 BBCH	4)aplikace dělená max. 1,5 l/ha za sezónu 6)semenné porosty
pískavice řecké seno, lnička setá, katrán etiopský	plevele lipnicovité, jednoleté, výdrol obilnin	0,4 – 0,8 l/ha	AT	1)postemergentně 2)od: 13 BBCH, do:29 BBCH	4)aplikace dělená max. 1,5 l/ha za sezónu 6)semenné porosty
svazenka shloučená	plevele lipnicovité jednoleté, výdrol obilnin	0,4 – 0,8 l/ha	AT	1)postemergentně 2)od: 13 BBCH, do:29 BBCH	4)aplikace dělená max. 1,5 l/ha za sezónu
svazenka shloučená	pýr plazivý, plevele lipnicovité vytrvalé	1,2 – 1,5 l/ha	AT	1)postemergentně 2)od: 13 BBCH, do:29 BBCH	4)aplikace dělená max. 1,5 l/ha za sezónu

ředkev, ředkvička	plevele lipnicovité, jednoleté	0,6 – 0,8 l/ha	30	1)postemergentně 2)od: 13 BBCH, do:29 BBCH	5) venkovní prostory
ředkev, ředkvička	pýr plazivý, plevele lipnicovité vytrvalé	1,0 – 1,5 l/ha	30	1)postemergentně 2)od: 13 BBCH, do:29 BBCH	5) venkovní prostory
petržel kořenová	plevele lipnicovité, jednoleté	0,5 – 0,8 l/ha	30	1)od: 12 BBCH 2)od: 13 BBCH do: 29 BBCH	5) venkovní prostory
petržel kořenová	pýr plazivý, plevele lipnicovité vytrvalé	1,2 – 1,5 l/ha	30	1)od: 12 BBCH 2)od: 13 BBCH do: 29 BBCH	5) venkovní prostory
celer bulvový, pastinák	pýr plazivý, plevele lipnicovité vytrvalé	1,0 – 1,5 l/ha	30	1)od: 09 BBCH 2)od: 13 BBCH do: 29 BBCH	5) venkovní prostory
celer bulvový, pastinák	plevele lipnicovité jednoleté	0,6 – 0,8 l/ha	30	1)od: 09 BBCH 2)od: 13 BBCH do: 29 BBCH	5) venkovní prostory
brokolice, květák	plevele lipnicovité jednoleté	0,5 – 1,0 l/ha	30	1)od: 09 BBCH 2)od: 13 BBCH do: 29 BBCH	5) venkovní prostory
brokolice, květák	pýr plazivý, plevele lipnicovité vytrvalé	1,0 – 1,5 l/ha	30	1)od: 09 BBCH 2)od: 13 BBCH do: 29 BBCH	5) venkovní prostory
hořčice	plevele lipnicovité jednoleté	0,6 – 0,8 l/ha	90	1)od: 12 BBCH do: 21 BBCH 2)od: 13 BBCH do: 29 BBCH	5) venkovní prostory 6)semenné porosty
hořčice	pýr plazivý, plevele lipnicovité vytrvalé	1,0 – 1,5 l/ha	90	1)od: 12 BBCH do: 21 BBCH 2)od: 13 BBCH do: 29 BBCH	5) venkovní prostory 6)semenné porosty
ředkev olejná pro produkci osiva pro strniskové směsky na zelené hnojení	výdrol obilnin	0,5 l/ha	AT	1) postemergentně	
ředkev olejná pro produkci osiva pro strniskové směsky na zelené hnojení	plevele lipnicovité jednoleté	0,5 – 0,8 l/ha	AT	1) postemergentně	
ředkev olejná pro produkci osiva pro strniskové směsky na zelené hnojení	pýr plazivý	1,2 – 1,5 l/ha	AT	1) postemergentně	

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní
OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem aplikace a sklizní

Plodina, oblast použití	**Dávka vody**	**Způsob aplikace**	**Max. počet aplikací v plodině**	**Interval mezi aplikacemi**

brokolice	75 – 300 l/ha	postřik	1x	
Celer bulvový	75 – 300 l/ha	postřik	1x	
Cizrna beraní	100 – 400 l/ha	postřik	1x	
Čičorka pestrá	100 – 400 l/ha	postřik	1x	
horčice	75 – 300 l/ha	postřik	1x	
Horčice sareptská	100 – 400 l/ha	postřik	1x	
Hrachor setý	100 - 400 l/ha	postřik	1x	
Hybrid jetele lučního a jetele prostředního (odrůda Pramendi)	100 - 400 l/ha	postřik	2x	14 – 21 dnů
Jetel alexandrijský	100 - 400 l/ha	postřik	1x	
Jetel bledožlutý	100 - 400 l/ha	postřik	2x	14 – 21 dnů
Jetel inkarnát	100 - 400 l/ha	postřik	1x	
Jetel panonský	100 - 400 l/ha	postřik	2x	14 – 21 dnů
Jetel perský	100 – 400 l/ha	postřik	2x	14 – 21 dnů
Jetel plazivý	100 – 400 l/ha	postřik	1x	
Jetel prostřední	100 – 400 l/ha	postřik	1x	
Jetel zvrhlý	100 – 400 l/ha	postřik	2x	14 – 21 dnů
Katrán etiopský	100 – 400 l/ha	postřik	2x	14 – 21 dnů
Komonice	100 – 400 l/ha	postřik	2x	14 – 21 dnů
Květák	75 – 300 l/ha	postřik	1x	
Lnička setá	100 – 400 l/ha	postřik	2x	14 – 21 dnů
Pastinák	75 – 300 l/ha	postřik	1x	
Petržel kořenová	100 – 400 l/ha	postřik	1x	
Pískavice řecké seno	100 – 400 l/ha	postřik	2x	14 – 21 dnů
Ředkev	200 – 300 l/ha	postřik	1x	
Ředkev olejná	100 – 400 l/ha	postřik	1x	
Ředkvička	200 – 300 l/ha	postřik	1x	
Sléz přeslenitý	100 – 400 l/ha	postřik	1x	
Svazenka shloučená	100 – 400 l/ha	postřik	2x	14 – 21 dnů
Štírovník jednoletý	100 – 400 l/ha	postřik	1x	
Štírovník růžkatý	100 – 400 l/ha	postřik	1x	
Tolice dětelová	100 – 400 l/ha	postřik	2x	14 – 21 dnů
Úročník lékařský	100 – 400 l/ha	postřik	1x	
Vičenec ligrus	100 – 400 l/ha	postřik	2x	14 – 21 dnů
Vikev setá	100 - 400 l/ha	postřik	1x	

2. termín aplikace: na obrůstající plevele

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:

Plodina	bez redukce	tryska 50 %	tryska 75 %	tryska 90 %
Ochranná vzdálenost vzhledem k povrchové vodě s ohledem na ochranu vodních organismů [m]				
Brokolice, celer bulvový, cizrna beraní, čičorka pestrá, hořčice, hrachor setý, jetel, katrán etiopský, komonice, květák, lnička setá, pastinák, petržel kořenová, pískavice řecké seno, ředkev, ředkev olejná, ředkvička, sléz přeslenitý, svazenka shloučená, štírovník růžkatý, štírovník jednoletý, tolice dětelová, úročník lékařský, vičenec ligrus, vikev setá	4	4	4	4

Další omezení:
Vzdálenost mezi hranicí plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.

Riziko za poškození vyplývající z faktorů ležících mimo dosah kontroly výrobce nese spotřebitel.
Rizika spojená s nedostatečnou účinností přípravku nebo jeho případnou fytotoxicitou nese ve smyslu ust. čl. 51 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 výlučně osoba používající přípravek.

Za škody vzniklé nevhodným skladováním anebo nevhodným použitím přípravku výrobce neručí.

® registrovaná ochranná známka společnosti ADAMA Agricultural Solutions Ltd., Izrael