Hnojivo

2,2 % P_2O_5 + 2,2 % K_2O + mikroelementy + přírodní bioregulátory rostlinného původu + aminokyseliny a vitamíny

AKTIFER GREEN

AktiFer Green je ideální hnojivo pro období nedostatku mikroživin. Jeho největší předností je biostimulační účinek, který pozitivně ovlivňuje růst rostlin, rozvoj kořenového systému a odolnost vůči špatnému počasí.

AktiFer Green chrání rostlinu před chorobami tím, že posiluje její imunitní systém. Aminokyseliny působí jako ideální přírodní adjuvant a zlepšují vlastnosti postřikové jíchy.

VÝHODY

- Listová aplikace
- Obsahuje adjuvanty
- Efektivní hnojení
- Bezpečné pro rostliny
- +EDTA — Obsahuje EDTA
- Mísitelné s pesticidy

OBSAH ŽIVIN

Živina	% hmotnostní
Dusík (N)	2,4
Bor (B)	**0,2**
Měď (Cu)	0,2
Železo (Fe)	**1,3**
Mangan (Mn)	0,5
Molibden (Mo)	**0,02**
Zinek (Zn)	0,5
Obsah organické hmoty	70
Hustota: 1,11 kg/l, pH 2,5 - 4,0	

Obsah:
1 l

Hmotnost:
1,11 kg

Biostimulátor růstu s makro a mikroelementy

Doporučené dávkování

PLODINA	POČET APLIKACÍ	MNOŽSTVÍ L / HA	OBDOBÍ APLIKACE
Obiloviny	3	2 - 3	**Podzim:** 1 aplikace od fáze 3 listů (BBCH 13–25) **Jaro:** 2 aplikace od začátku vegetace až do začátku metání (BBCH 31–50)
Kukuřice	1	2 - 3	Ve fázi 4–8 listů (BBCH 14–18)
Cukrová řepa	1	2 - 3	Od fáze 4–6 listů až do uzavření řádků (BBCH 16–39)
Řepka olejka	2 - 3	2 - 3	**Podzim:** 1 aplikace od fáze 6–8 listů (BBCH 16–25) **Jaro:** 1–2 aplikace od začátku prodlužování až po začátek tvorby květů (BBCH 30–52)
Vinná réva	2	3	První aplikace od fáze 5–6 listů až po fázi zvětšování květenství (BBCH 14–55), druhá aplikace od začátku vývoje plodů až do konce zrání plodů (BBCH 71–89)
Jádroviny	3	2 - 3	Během kvetení a intenzivního růstu plodů (BBCH 51–89)
Peckoviny	2	2 - 3	Během kvetení a intenzivního růstu plodů (BBCH 51–89)
Mrkev, cibule, pórek, tuřín	2	2 - 3	Pro posílení vůči stresovým faktorům doporučujeme první aplikaci od fáze 4 listů (BBCH 14–16) a druhou o 14 dní později

PŘÍPRAVA PRACOVNÍ TEKUTINY:
Hnojivo může být mísitelné s většinou přípravků na ochranu rostlin. Během prvního použití směsi v nádrži je doporučeno provést zkušební směs v menším množství vody. Během zhotovování pracovní tekutiny je třeba:

1: naplnit nádrž postřikovače do poloviny vodou,
2: zapnout míchací zařízení,
3: nalít odměřené množství hnojiva,
4: případně můžete přidat přípravek na ochranu rostlin,
5: doplnit vodou do požadovaného objemu, tekutinu musíte použít ihned po zhotovení.

Po provedení zákroku umyjte postřikovač vodou, ledaže použitý ochranný přípravek vyžaduje jiný způsob mytí.

TECHNIKA POSTŘIKU:
Hnojivo může být použito ve všech postřikovačích, doporučený objem vody je 200-1000 l/ha. Pro zlepšení účinnosti listového hnojiva by procedura měla být provedena večer nebo ráno, a nebo během pochmurného dne. Během tekutého hnojení půdy hnojivem může být použit pro všechny zavlažovací systémy i pro kapací.

KOMBINACE S PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN:
Hnojivo je při uvedených koncentracích mísitelné s běžnými přípravky na ochranu rostlin. Před velkoplošnou aplikací takto vzniklých směsí je však vždy doporučeno vyzkoušet je nejprve na menší ploše. Vždy je nutné respektovat údaje výrobce o vzájemné mísitelnosti.

SKLADOVÁNÍ:
Hnojivo skladujte a převážejte v originálních neprodyšně uzavřených obalech, při teplotě od +5°C do +30°C, vyvarujte se náhlých změn teplot. Během skladování v nevhodných podmínkách (např. v teplotě pod +5°C) může dojít k částečnému vysolení nebo k přebarvení hnojiva. Vzniklé krystaly se po zředění vodou znovu rozpustí. Tyto procesy nemají vliv na kvalitu výrobku. Zbytek pracovní tekutiny by měl být rozprášen na postříkaném povrchu. Nesmí být vléván do kanalizačního systému. Neskladovat ve vrstvách. Obsah/obal likvidujte v souladu s platnými místními předpisy.

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI:
- Důkladně si umyjte ruce a tvář po použití přípravku.
- Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranu očí a obličeje.
- V PŘÍPADĚ ZASAŽENÍ KŮŽE: Umyjte velkým množstvím vody a mýdlem.
- V PŘÍPADĚ PODRÁŽDĚNÍ OČÍ: Opatrně oplachujte oči vodou několik minut. Vyjměte kontaktní čočky, pokud je máte nasazeny a pokud jdou snadno vyndat. Pokračujte ve vyplachování.
- POKUD PODRÁŽDĚNÍ OČÍ PŘETRVÁVÁ: Vyhledejte odbornou pomoc / navštivte lékaře.

Dodržujte pokyny pro použití, abyste zabránili rizikům pro člověka a životní prostředí. Pouze pro profesionáln íuživatele.

Doba použitelnosti: do 24 měsíců od data výroby

Datum výroby a číslo šarže jsou na obalu.

DODAVATEL:

VÝROBCE (ES 2003/2003):

BIOAKTIV/CZ
BioAktiv CZ s.r.o.
Bořivojova 878/35
130 00 Praha 3
www.aktifer.cz