Altima 500 SC

ŠPIČKOVÁ OCHRANA HLÍZ

- Výborný účinek na plíseň bramborovou
- Ochrana hlíz proti infekci
- Antispurulační účinek – zabraňuje klíčení spor a růstu mycelia
- Vedlejší efekt na Alternaria spp.
- Odolnost proti dešti

Detaily produktu

Účinná látka
fluazinam 500 g/l

Formulace
suspenzní koncentrát (SC)

ALTIMA je kontaktní fungicid s protektivní účinností proti plísni bramborové. Účinná látka fluazinam patří do skupiny nitroanilinů a vyznačuje se dlouhodobým reziduálním a antisporulačním účinkem. Inhibuje klíčení spor, průnik, růst a sporulaci hyf. Již 15 minut po aplikaci vykazuje odolnost proti dešti.
Na listě vytváří ochranný fungicidní film, který zabraňuje klíčení spor na povrchu listů a stonků, tento film vytváří i na půdě, kde zabraňuje proniknutí spor ke hlízám. Pro svůj antisporulační účinek se používá hlavně v druhé polovině vegetace na ochranu hlíz před infekcí..
Vzhledem ke kontaktnímu účinku přípravku je třeba použít dávku vody 300–400 l/ha (zvláště důležité v porostech s mohutnou natí).

MSDS

BALENÍ 1 L, 5 L

Plodina	Škodlivý organismus	Aplikační dávka	OL
brambor	plíseň bramborová	0,3-0,4 l/ha	14

Přípravek Altima 500 SC lze použít kdykoliv během vegetace.
Předpokladem dobrého účinku přípravku je jeho okamžité použití, jakmile se plíseň bramborová objeví v porostu a hrozí napadení natě. A aplikuje se preventivně v intervalu 10–14 dní. Nižší dávka 0,3 l/ha se použije zejména na počátku sledů postřiků při nižším infekčním tlaku a při aplikacích především v první polovině vegetačního období, krátce před uzavřením natě v řádcích nebo mezi řádky. Vyšší dávka 0,4 l/ha se použije při vyšším tlaku choroby a v závěru vegetace během stárnutí natě pro ochranu hlíz. Intervaly mezi aplikacemi se zkrátí na 7-10 dní.

Doporučení pro aplikaci :

- přípravek má kontaktní účinek proto je důležité dokonalé pokrytí bramborové natě postřikovou kapalinou, doporučujeme použít minimálně 200 l vody na ha
- od 3. postřiku přidávejte do TM přípravek NARITA (0,5 l/ha) pro posílení účinnosti proti Alternariassp., zejména u citlivých odrůd a v případě vyššího infekčního tlaku
- pro své antisporulační vlastnosti používejte na ochranu hlíz ve druhé polovině vegetace, ideálně jako předposlední ošetření, před ošetřením přípravkem Ranman Top