



CYMBAL, ABY SES PLÍSNĚ NEBÁL

- ▶ Lokálně systemický způsob účinku
- ▶ Preventivní a kurativní účinek
- ▶ Rychle proniká do rostlin (1-4 hodiny)
- ▶ Odolný proti srážkám
- ▶ Flexibilní využití v rámci aplikačního programu (v závislosti na podmínkách prostředí a intenzity infekce)
- ▶ Ekonomicky výhodné použití
- ▶ Výhodný kombinační partner s kontaktními přípravky
- ▶ Využitelný v rámci integrované ochrany rostlin (ipm)

Detaily produktu

Účinná látka

cymoxanil 450 g/kg

Formulace

dispergovatelné granule (WG)

Přípravek je povolený k použití pouze profesionálními uživateli.

CYMBAL® je fungicid obsahující účinnou látku cymoxanil určený k ochraně brambor proti plisni bramborové a ochraně vinné révy proti plisni révové. Působí preventivně (brání klíčení zoospór a jejich průniku do listů), kurativně a antisporulačně (zastavuje šíření infekce z napadených rostlin na zdravé). Rychlý příjem a transport cymoxanilu v ošetřených rostlinách (je rozváděn translaminárně, tj. od jedné strany listu ke druhé a omezeně do nových neošetřených přírůstků rostliny) zajišťuje vysoký účinek i v deštivém období.



Plodina	Škodlivý organismus	Dávkování, mísitelnost	OL
brambor	plíseň bramborová	0,2-0,25 kg/ha + Dithane DG Neotec - TM	AT
réva	plíseň réвовá	0,125 kg/ha do BBCH 61 (počátek kvetení), max. 500 l vody/ha 0,25 kg/ha od BBCH 61 (počátek kvetení), max. 1000 l vody/ha + Folpan 80 WG- TM	AT

V bramborách se vyšší dávka z uvedeného rozmezí použije v případě očekávaného vyššího infekčního tlaku.

Počet aplikací:

Brambor: max. 4x v plodině

Réva: max. 7x za rok

Dávka vody:

Brambor: 200 - 600 l/ha

Réva: 500 - 1000 l/ha

Přípravek se aplikuje postřikem nebo rosením.

Přípravek v tank-mix směsi s přípravky Dithane DG Neotec je třeba použít v souladu s návody na jejich použití. Rovněž je možné využít TM s přípravkem Mildicut.

Upřesnění podmínek aplikace

Porosty ošetřujte preventivně, na základě signalizace.

Interval mezi jednotlivými aplikacemi je 7-10 dnů, v závislosti od podmínek počasí a intenzity napadení

Doporučení pro aplikaci :

- díky svým vlastnostem (posiluje účinek) doporučujeme použití v kombinaci s přípravky obsahující účinné látky:
Brambory: mankozeb, promamokarb, fluazinam
Vinná réva: folpet, měď, mankozeb
- rovněž je možné využít TM s přípravkem Mildicut

