



## NADČASOVÉ ŘEŠENÍ PRO PRVNÍ APLIKACE

- ▶ 2 Účinné látky - systémová i kontaktní => jistota dvojího způsobu účinku
  - Cymoxanil (systém) - preventivní i kurativní účinek, STOP EFEKT (zastaví rozvoj patogena)
  - Fluazinam (kontakt) – protektivní účinek
- ▶ Výborný účinek proti plísni bramboru
- ▶ Významný vedlejší účinek na další choroby brambor :  
Sclerotinia ssp., Alternaria ssp., Botrytis cinerea
- ▶ Alternativa pro náhradu produktů s mancozebem
- ▶ Vhodný pro jakoukoliv variantu v termínu ošetření během růstu brambor
- ▶ Výborné reference z vyspělých bramborářských zemí (BENELUX, Anglie)



### Detaily produktu

#### Účinná látka

**250 g/kg cymoxanil + 375 g/kg fluazinam**

#### Formulace

**vodorozpustné granule (WG)**

Přípravek KUNSHI obsahuje účinné látky fluazinam a cymoxanil.

Fluazinam je kontaktní fungicid s protektivní účinností. Zabraňuje klíčení spór a růstu mycelia.

Cymoxanil je foliární fungicid s protektivní a kurativní účinností. Působení cymoxanilu je kontaktní a lokálně systémové (translaminární).

Zabraňuje klíčení spór a růstu mycelia.

MSDS



BALENÍ



1 Kg

Plodina	Škodlivý organismus	Dávkování	Dávka vody	OL
brambor	pлiseň bramborová	0,4 - 0,5 kg/ha	200-500 l/ha	7

Ošetruje se preventivně nebo při zjištění prvních příznaků choroby.

Optimální dávka se volí podle sily infekčního tlaku a na základě signalizace.

V průběhu sezony se ošetruje maximálně 8 x v intervalu 7-10 dní, při silném infekčním tlaku se interval zkrátí na 7 dní.

#### Doporučení pro aplikaci :

- v rámci postříkového programu aplikujte na začátku – ideálně první 3 postříky
- přípravek nejdříve do nádrže postříkovače naplněné do poloviny vodou důkladně rozmíchejte a doplňte vodou na stanovený objem
- od 3. postříku přidávejte do TM přípravek NARITA k pojištění účinnosti vůči listovým skvrnitostem brambor (*Alternaria spp.*) - zejména u citlivých odrůd a v případě stresových faktorů během vegetace – střídání vysokých a nízkých teplot, period sucha a vlhka atd.

2 účinné látky = jistota dvojího účinku

**Kunshi®** 0,5 kg/ha

125 g/ha CYMOXANIL

• Kurativní působení

Výborný partner pro složité situace



FLUAZINAM 188 g/ha

Preventivní účinek *P. infestans*

Multifunkční fungicid (FRAC)

Ochrana hlíz

Významný vedlejší účinek

na *Sclerotinia spp.*

Alternativa k mancozebu

• 0,25 kg/ha Cymbol (112,5 g ú.l./ha)

• 0,3 L/ha standardní přípravek (150 g ú.l./ha)

◀ Kunshi ▶

