

Proman®

PROMAN V BRAMBORÁCH JE FACHMAN

- ▶ Selektivita – bezpečnost pro pěstované brambory
- ▶ Flexibilita – možnost aplikace za všech klimatických situací
- ▶ Preemergentní použití
 - Odstraňuje plevely včas – dokud nepůsobí konkurenčně
 - Bezpečné i pro odrůdy brambor citlivé k jiným herbicidům
- ▶ Účinnost - široké spektrum plevelů
- ▶ Vhodný pro TM (tank mix) s dalšími herbicidy

Detaily produktu

Účinná látka

500 g/l metobromuron

Formulace

suspensní koncentrát (SC)

Přípravek PROMAN je selektivní postřikový herbicid. Působení účinné látky je v oblasti blokace fotosyntézy plevelů. Na plevelné rostliny působí hlavně přes kořeny a v menším měřítku také přes listy. Působení přípravku je dlouhodobé a je závislé na použité dávce, druhu půdy a srážkách.



Plodina	Škodlivý organismus	Dávkování	Dávka vody	OL
brambor	lipnice roční, ježatka kuří noha, plevele dvouděložné jednoleté	3 – 4 l/ha	200-400 l/ha	AT

Přípravek se aplikuje vždy před vzejitím plodiny. Maximální počet aplikací v plodině – 1 x.

Název plevelé	3 l Proman	2,5 l Proman + 2,5 l Roxy 800 E	2,5 l Proman + 0,2 Command 36 CS
Bažanka roční			
Heřmánek pravý			
Hluchavka nachová			
Kokoška pastuší tobolka			
Laskavec ohnutý			
Lilek černý			
Merlík bílý			
Opletka obecná			
Pětour malolobný			
Ptačinec žabinec			
Rdesno červivec			
Rozrazil rezekvítek			
Řepka výdrol			
Starček obecný			
Svízel přitula			
Truskavec ptačí			
Violka rolní			
Zemědým lékařský			
Jednoděložné trávy			
Ježatka kuří noha			
Lipnice roční			

Následné plodiny :

Pěstování následných plodin bez omezení. Nedoporučuje se vysévat brukvovité plodiny ve stejném roce po aplikaci přípravku. V následujícím roce lze vysévat brukvovité plodiny a řepu po předchozí orbě.

Náhradní plodiny

V případě předčasné likvidace porostu lze jako náhradní plodinu po uplynutí 30 dnů od aplikace vysévat nebo sázet brambory, kukuřici, bob, hrách nebo mrkev. Pšenici lze vysévat s odstupem 4 měsíců od aplikace bez orby, po orbě lze vysévat s odstupem 2,5 měsíce. Kultivace půdy před výsevem snižuje riziko poškození plodiny.

Doporučení pro aplikaci :

- doporučená dávka vody – 200-400 l/ha
- použijte v TM (tank mixu) s herbicidy rozšiřujícími plevele spektrum – především na svízel přitulu :
 - 2,5 l/ha PROMAN + 0,2 l/ha COMMAND (CENTIUM - clomazone 360 g/l)
 - 2,5 l/ha PROMAN + 2,5 l/ha ROXY (prosulfocarb 800 g/l)
 - využijte nabídku výhodných balíčků – více informací u vašich distributorů
 - PROMAN 2 l/ha + SENCOR 0,4 l/ha
- v registračním řízení aplikace do slunečnice a sóji

■ > 95 %

■ > 85-95 %

■ > 75-85 %

■ > 65-75 %

■ < 65 %