

RAPSAN PLUS

MÁŠ-LI DOBRÝ VKUS KUP SI RAPSAN PLUS

- ▶ Odstraní spolehlivě konkurenci plevelů – účinný na nejdůležitější plevele škodící řepce :
 - Dvouděložné : heřmánkovité, hluchavky, svízele, laskavce, pěťoury, mléč, ptačince, rozrazil, kokošky atd.
 - Jednoleté lipnicovité : chundelka metlice, ježatka kuří noha atd.
- ▶ Jednodušší plánování termínu aplikace - pro termín aplikace není důležitá růstová fáze řepky – řídíme se pouze vývojovým stádiem plevelů (do doby děložních lístků – tj. 8-10 dní po aplikaci) -> snížení rizika při deštivém počasí těsně po aplikaci atd.
- ▶ Časné odstranění plevelů - od začátku založení porostu umožní řepce vzcházení bez konkurence plevelů
- ▶ Úspora nákladů při aplikaci - možnost mísení (TM) s fungicidy, insekticidy, růstovými regulátory i graminicidy
- ▶ Bezpečný pro ozimou řepku - vysoká selektivita vůči řepce a to i pro citlivé odrůdy

Detaily produktu

Účinná látka

metazachlor 333 g/l + chinmerak 83 g/l

Formulace

suspenzní koncentrát (SC)

RAPSAN PLUS je herbicid určený k hubení jednoletých jedno i dvouletých plevelů v porostech řepky a hořčice. Je přijímán především prostřednictvím kořenů při vzcházení. Po vzejití je částečně přijímán i listy plevelných rostlin. Po aplikaci na půdu před vzejitím plevelů je přijímán klíčovými plevely a působí jejich odumření před nebo krátce po vyklíčení. Hubí i plevele do fáze děložních lístků, které jsou v době ošetření již vzešlé. Přípravek nejlépe účinkuje při dostatečné půdní vlhkosti. Při aplikaci za sucha se herbicidní účinek dostaví při pozdějších srážkách. Podle současných poznatků je RAPSAN PLUS dobře snášen všemi odrůdami řepky.

Pro zajištění dobré snášenlivosti řepkou je třeba dodržet hloubku setí 1.5-2 cm a semena řepky musí být zakryta dostatečnou vrstvou drobtovité zeminy



Plodina	Škodlivý organismus	Dávkování	Použití	OL
řepka olejka	plevele dvouděložné, plevele lipnicovité jednoleté	2 l/ha	- do: fáze děložních lístků - před vzejitím, po vzejití	AT
hořčice bílá	plevele dvouděložné, plevele lipnicovité jednoleté	2 l/ha	- do: fáze děložních lístků - postemergentně	AT

Název plevelu	Rapsan Plus
Béry	
Heřmánky	
Hluchavka nachová	
Hulevník lékařský	
Chundelka metlice	
Ježatka kuří noha	
Kakost	
Kokoška pastuší tobolka	
Konopice rolní	
Laskavec ohnutý	
Lílek černý	
Lipnice roční	
Mák vlčí	
Merlík bílý	
Mléč zelinový	
Opletka obecná	
Penízek rolní	
Petoury	
Pcháč oset	
Pryšce	
Psárka rolní	
Ptačinec žabinec	
Rdesna	
Rosička krvavá	
Rozrazilý	

> 95 %
 > 85-95 %
 > 75-85 %
 > 65-75 %
 < 65 %

Název plevelu	Rapsan Plus
Ředkev ohnice	
Starček obecný	
Svízel přítula	
Úhorník	
Violka rolní	
Zemědým lékařský	

Termín aplikace

Postřik se provádí před vzejitím, nebo i po vzejití, nezávisle na růstové fázi řepky, nejlépe v růstové fázi 1. pravého listu řepky.

Pěstování dalších plodin po zaořávce

Pokud je nutno v důsledku vyzimování nebo sucha ozimou řepku zaořit, lze jako následnou plodinu zařadit jarní obiloviny, jarní řepku, brambory, cukrovku a kukuřici. Před výsevem je třeba provést orbu do hloubky alespoň 15 cm. Po běžné sklizené řepce (ozimé i jarní) či hořčici ošetřené Rapsanem Plus lze pěstovat jakoukoliv plodinu bez omezení.

Doporučení pro aplikaci :

- doporučená dávka vody – 200-300 l/ha
- aplikujeme po zasetí řepky do cca. 8-10 dnů
- aplikujeme na pozemek bez větších hrud a kamenů – příliš kypré či hrudovité půdy je třeba uválet (semena plevelů by jinak klíčila zpod hrud a kamenů, aniž by se dostala do kontaktu s herbicidem)
- nezpracované posklizňové zbytky mohou (zejména při minimálním zpracování) negativně působit na účinnost přípravku