

ROXY 800 EC

VE MĚSTĚ I NA VSI POMŮŽE VÁM ROXY

- ▶ Specialista na svízel přítulu , violku a trávovité plevely
- ▶ Řešení rezistentních populací chundelky metlice k sulfonylmočovinám
- ▶ Vhodný pro TM (tank mix) s dalšími herbicidy

Detailly produktu

**Účinná látka
prosulfokarb 800 g/l**

**Formulace
emulgovatelný koncentrát (EC)**

Účinná látka prosulfokarb je přijímána prostřednictvím meristematických pletiv klíčků a kořenů plevelů, kde v nejmladších částech brzdí prodlužování a dělení buněk. Hlavního účinku je dosahováno příjemem účinné látky přes hypokotyl plevelů. Prosulfokarb brzdí klíčení plevelních rostlin krátce po začátku klíčení.



Plodina	Škodlivý organismus	Dávkování	Dávka vody	OL	Poznámka
pšenice ozimá, ječmen ozimý, triticale ozimé, žito ozimé	plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté	4 l/ha	200-400 l/ha	AT	maximální počet aplikací v plodině 1 x
brambor	plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté	4 l/ha	200-400 l/ha	AT	-



Herbicidní film vzniklý při správné aplikaci přípravku nesmí být porušen zpracováním půdy anebo prudkými srážkami bezprostředně po postřiku. Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost, herbicid musí být aktivován např. srážkami.

Na půdách s vyšší sorpční schopností a na půdách s vysokou náhylností na vysychání povrchových vrstev nelze vyloučit snížení účinnosti. Nelze vyloučit projevy fytotoxicity na ošetřovaných plodinách.

Pokud po aplikaci přípravku následují srážky, nelze vyloučit, zejména na lehkých půdách, splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a následné poškození ošetřovaného porostu. Při aplikaci na písčitých půdách, zejména s obsahem humusu pod 1%, není vyloučeno poškození porostu.

Následné plodiny: V případě, že došlo k zaorávce plodiny ošetřené přípravkem Roxy 800 EC, lze po provedené orbě pěstovat kukuřici. Při zaorávce obilnin na jaře lze pěstovat jarní obilniny, kukuřici, Brambory, hrášek nebo slunečnice.

Náhradní plodiny: V témže roce na podzim lze jako následné plodiny pěstovat po orbě ozimé obilniny nebo řepku olejku. Následné plodiny pěstované v následujícím roce na jaře lze pěstovat bez omezení, kromě fazolu.

Doporučení pro aplikaci :

- doporučená dávka vody – 200-400 l/ha
- u brambor použijte v TM (tank mix) s herbicidy rozšiřujícími plevelné spektrum – především na dvouděložné plevele :
 - ROXY 2 - 3 l/ha + PROMAN 2 - 3 l/ha (metobromuron 500 g/l) – využijte nabídku výhodného balíčku – více informací u vašich distributorů
 - ROXY 3 l/ha + 0,5 l SENCOR LIQUID (metribuzin 600 g/l)
- u obilnin pro pokrytí kompletního plevelného spektra kombinujte s přípravkem Diflanil: Roxy 2 l/ha + Diflanil 0,2 l/ha

[Color key: Dark Green > 95 %, Green > 85-95 %, Yellow > 75-85 %, Orange > 65-75 %, Red < 65 %]