

GramiGUARD

PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN

Selektivní postřikový herbicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentráту (EC) proti jednolétým lipnicovitým plevelům, výdrolu obilnin a píru plazivému v porostech cukrovky a krmné řepy, řepky olejky ozimé, máku setého jarního, cibule, jahodníku, mrkve a zelí.

PROFESIONÁLNÍ UŽIVATEL

Název a množství účinné látky: klethodim 120 g/l (14 % hmot.)

Název nebezpečné látky: Methyl ester mastných kyselin; Ethoxylovaný lojový alkyl aminů, polyethylene glycol hydrogen sulphate C12-14 alkyl ether; solventní nafta (petroleum) těžká aromatická; 1,2,4 trimethylbenzen; Mesitylen; Naftalen

H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P301 + P310 PŘI PÓŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P312 Nečítejte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P391 Uniklý produkt seberte.

P403 + P233 Skladujte na dobře větraném místě.

Uchovávejte obal těsně uzavřený.

EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

EUH208 Obsahuje klethodim. Může vyvolat alergickou reakci.

EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

DRŽITEL POVOLENÍ: Arysta LifeScience S.A.S.,
Route d'Artix BP80, 64150, Noguères, Francie

PRÁVNÍ ZÁSTUPCE: Arysta LifeScience Czech s.r.o.,
Novodvorská 803/82, 142 00 Praha 4, tel: 606 675 715

DISTRIBUTOR V ČR: SOUFFLET AGRO a.s.,
Průmyslová 2170/12, 796 01 Prostějov, tel: 582 328 320

**OSOBA ODPOVĚDNÁ ZA KONEČNÉ BALENÍ A OZNAČENÍ
ROSTLIN NA TRHU:** Arysta LifeScience S.A.S.,

Route d'Artix BP80, 64150, Noguères, Francie

EVIDENČNÍ ČÍSLO PŘÍPRAVKU: 4903-1
ČÍSLO ŠARŽE / DATUM VÝROBY FORMULACE:

uvedeno na obalu
DOBA POUŽITELNOSTI: 2 roky od data výroby; teplota
skladování + 5 °C až + 30 °C.

MNOŽSTVÍ PŘÍPRAVKU V OBALU: HDPE kanystř
se šroubovým uzávěrem a obsahem 5 l přípravku



NEBEZPEČÍ



soufflet
AGRO

5^L

ZPŮSOB PŮSOBENÍ: GramiGUARD je selektivní postemergentní herbicid proti výdrolu obilnin, jednoletým a vytrvalým jednoděložným plevelům. Obsahuje 120 g/l účinné látky klethodim, která patří chemicky do skupiny cyklohexanonů. Přípravek účinkuje systemicky, účinná látka proniká přes listy vzešlých plevelů v průběhu 1 hodiny po aplikaci a meristematickým pletivem je rozváděna do celé rostliny. Mechanismus účinku spočívá v inhibici syntézy mastných

kyselin, tím dochází ke zničení pletiv u citlivých trav. Zasažené citlivé plevele přestávají růst a postupně odumírají. Dostatečná teplota a vzdušná vlhkost podporují účinnost přípravku. Herbicidní účinek se podle povětrnostních podmínek projeví za 7–10 dní po aplikaci, za podmínek nepříznivých pro růst (sucho a chlad) se projeví později. Zpravidla ale po 7 dnech dochází k zastavení růstu plevelných trav.

NÁVOD K POUŽITÍ:

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, míselnost	OL (dny)	Poznámka 1) k plodině, 2) k ŠO, 3) k OL, 4) k dávkování, 5) k umístění 6) k určení sklizně
cukrovka, řepa krmná	plevele lipnicovité jednoleté	0,8 l/ha	56	1) od: 12 BBCH do: 18 BBCH 2) od: 12 BBCH do: 29 BBCH
cukrovka, řepa krmná	pýr plazivý	2,0 l/ha	56	1) od: 12 BBCH do: 18 BBCH 2) od: 12 BBCH do: 29 BBCH
řepka olejka ozimá	plevele lipnicovité jednoleté, výdrol obilnin	0,8 l/ha	120	1) od: 12 BBCH do: 30 BBCH 2) od: 12 BBCH do: 15 BBCH
mák setý jarní	plevele lipnicovité jednoleté	0,8 l/ha	90	1) od: 19 BBCH do: 29 BBCH 2) od: 12 BBCH do: 29 BBCH
mák setý jarní	pýr plazivý	2,0 l/ha	90	1) od: 19 BBCH do: 29 BBCH 2) od: 12 BBCH do: 29 BBCH
cibule	plevele jednoděložné jednoleté	0,8 l/ha	56	1) od: 1.-2. listu 2) od: 12 BBCH do: 15 BBCH
cibule	pýr plazivý	2,0 l/ha	56	1) od: 1.-2. listu 2) od: 14 BBCH do: 16 BBCH
jahodník	plevele jednoděložné jednoleté	0,8 l/ha	30	1) před květem nebo po sklizni 2) od: 12 BBCH do: 15 BBCH
jahodník	pýr plazivý	2,0 l/ha	30	1) před květem nebo po sklizni 2) od: 14 BBCH do: 16 BBCH
mrkev	plevele jednoděložné jednoleté	0,8 l/ha	40	1) od: 12 BBCH 2) od: 12 BBCH do: 15 BBCH
mrkev	pýr plazivý	2,0 l/ha	40	1) od: 12 BBCH 2) od: 14 BBCH do: 16 BBCH
zeří	plevele jednoděložné jednoleté	0,8 l/ha	28	1) po zakoření sazenic 2) od: 12 BBCH do: 15 BBCH
zeří	pýr plazivý	2,0 l/ha	28	1) po zakoření sazenic 2) od: 14 BBCH do: 16 BBCH

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití	Dávka vody	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině
cukrovka, mák setý, řepa krmná	200–300 l/ha	postřik	1x
řepka olejka ozimá	200–300 l/ha	postřik	1x na jaře nebo na podzim
cibule	200–300 l/ha	postřik	1x
jahodník	200–300 l/ha	postřik	1x / rok
mrkev	200–300 l/ha	postřik	1x
zeří	200–300 l/ha	postřik	1x / rok

UPŘESNĚNÍ POUŽITÍ:

Spektrum účinnosti: pýr plazivý, chundelka metlice, ježatka kuří noha, ověs hluchý, lipnice roční, výdrol oblabin

Řeпа krmná: Riziko fyto toxicity v krmné řepě konzultujte s držitelem povolení.

Vliv přípravku na kvantitativní a kvalitativní výnosové parametry krmné řepy konzultujte s držitelem povolení. • Vliv ošetření na změny při zpracování plodin konzultujte s držitelem povolení. • Přípravek není určen pro použití do množitel-ských porostů cukrovky a krmné řepy.

Následná a náhradní plodiny: Pěstování následných plodin je bez omezení. V případě předčasné zaořádky lze jako náhradní pěstovat ty plodiny, pro které je aplikace přípravku doporučována, nebo jiné dvouleté plodiny.

Opatření k minimalizaci pravděpodobnosti vývoje rezistence: K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku na bázi inhibitorů AAC-azy (acetyl CoA karboxylázy), na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetření jiným herbicidem s odlišným mechanismem účinku.

OCHRANNÉ VZDÁLENOSTI A JINÁ OPATŘENÍ A OMEZENÍ S OHLEDEM NA OCHRANU ZDRAVÍ LIDÍ, NEČLOUVĚK ORGANISMŮ A SLOŽEK ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

SP1 Nečečišťujte vodu přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod / Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest).

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu nečlověckých organismů:

	bez redukce	tryska 50 %	tryska 75 %	tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu nečlověckých rostlin [m]				
cukrovka, krmná řepa, mák setý jarní, mrkev, cibule, zelí, jahodník	10	5	5	0
řepka olejka ozimá	5	5	0	0

DALŠÍ OMEZENÍ: Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob. • Opětovný vstup na ošetřený pozemek je možný až po zaschnutí. • Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty. • Při přípravě aplikační kapaliny ani při provádění postřiku nepoužívejte kontaktní čocky. • Přípravek nelze aplikovat ručním postřikovačem.

PŘÍPRAVA APLIKAČNÍ KAPALINY: Odměřené množství přípravku vlijte za stálého míchání do nádrže postřikovače naplněné do poloviny vodou a doplňte na stanovený objem. Použijte předmíchávací zařízení, je-li jim postřikovač vybaven. K přípravku není nutno přidávat směračedlo.

ČISTĚNÍ ZAŘÍZENÍ PRO APLIKACI PŘÍPRAVKŮ: Aplikační zařízení okamžitě po použití vyprázdněte a opakovaně (alespoň 2x) vypláchněte vodou (vždy min. čtvrtinu objemu nádrže postřikovače), případně čistícím přípravkem KeepGUARD v souladu s návodem na jeho použití. Nevypalčujte v dosahu zdrojů podzemních a povrchových recipientů vody! Nedostatečně vypláchnutí aplikační zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PŘÍSTROJE:

Ochrana dýchacích orgánů: není nutná

Ochrana rukou: gumové nebo plastové rukavice označené piktogramem pro chemická nebezpečí podle ČSN EN 420+A1 s uvedeným kódem podle přílohy A k ČSN EN ISO 374-1

Ochrana očí a obličeje: není nutná

Ochrana těla: celkový pracovní/ochranný oděv z textilního materiálu např. podle ČSN EN 14605+A1 nebo jiný ochranný oděv označený piktogramem „ochrana proti chemikáliím“ podle ČSN EN ISO 13688

Dodatečná ochrana hlavy: není nutná

Dodatečná ochrana nohou: pracovní nebo ochranné obuv (např. gumové nebo plastové holínky) podle ČSN EN ISO 20346 nebo ČSN EN ISO 20347 (s ohledem na práci v zemědělském terénu)

Společný údaj k OOPP: poškozené OOPP (např. protřžené rukavice) je třeba vyměnit.

Je-li pracovník při vlastní aplikaci dostatečně chráněn v uzavřené kabině řidiče, OOPP nejsou nutné. Musí však mít přichystané alespoň rezervní rukavice pro případ poruchy zařízení.

INFORMACE O PRVNÍ POMOCI:

Všeobecné pokyny: Projeví-li se přetrvávající zdravotní potíže (nevolnost, ospalost a závrať, bolest hlavy, slzení, zarudnutí), pálení očí, podozření na alergickou reakci nebo přetrvávající-li dýchací potíže) nebo v případě pochybnosti uvědomte lékaře a poskytněte mu informace ze štítku, příbalového letáku nebo bezpečnostního listu. • Při bezvědomí nebo sníženém vědomí uložte postiženého do stabilizované polohy na boku, s mírně zakloněnou hlavou, uvolněte oděv a dbejte o průchodnost dýchacích cest.

První pomoc při nadychnutí: Přerušete práci. Přejděte mimo ošetřovanou oblast.

První pomoc při zasažení čocky: Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem, pokožku dobře opláchněte.

První pomoc při zasažení očí: Nejprve odstraňte kontaktní čocky, pokud je používáte, současně vyplachujte prostor pod víčky po dobu alespoň 10 minut velkým množstvím vlažné tekoucí čisté vody. Kontaktní čocky nelze znovu použít, je třeba je zlikvidovat.

První pomoc při náhodném požití: NIKDY nevyvolávejte zvracení. Vypláchněte ústa vodou (pouze je-li postižený vědomý). Při vylhání lékařské pomoci informujte o přípravku, se kterým se pracovalo a o poskytnuté první pomoci. Další postup první pomoci lze konzultovat s **Toxikologickým informačním střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.**

SKLADOVÁNÍ: Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech v uzamčených, suchých a větrákových skladech při teplotách + 5 °C až + 30 °C. Uchovejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Chraňte před mrazem, vlnkem, přímým slunečním svitem a sáláním tepelných zdrojů. Uchovejte mimo dosah dětí.

LIKVIDACE OBALŮ A ZBYTKŮ: Technologicky již nepoužitelný přípravek včetně nevypalčované obalu je v souladu s místní a zaručené právní úpravou (zákon o odpadech) nutno likvidovat jako nebezpečný odpad. • Zbytky postřikové kapaliny a oplachové vody zředit vodou v poměru cca 1:5 a beze zbytku vyštířte na ošetřovaném pozemku, přičemž nesmíte být zasaženi zdroji podzemních a recipientů povrchových vod. • Prázdné obaly od přípravku 3x důkladně vypláchněte (oplachovou vodu použijte pro přípravu postřikové kapaliny), znehodnotěte a předejte prostřednictvím sberného místa do sběru recyklační nebo spalnění ve schválené spalně. • Obaly od přípravku nikdy nepoužívejte k jiným účelům! Zabraňte kontaminaci podzemních a povrchových vod.

DALŠÍ ÚDAJE A UPŘESNĚNÍ: GramiGUARD používejte pouze v souladu s návodem na použití na této etiketě. Držitel povolení zaručuje kvalitu přípravku pouze v případě, že je uchovávaný v originálních těsně uzavřených obalech a neručí za škody vzniklé nesprávným skladováním, zacházením, aplikací nebo použitím v rozporu s návodem na této etiketě.