

Přípravek na ochranu rostlin

Stratos® Ultra

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE PŘILOŽENÝ NÁVOD K POUŽITÍ.

Postřikový selektivní systémový postemergentní herbicid ve formě emulgovatelného koncentrátu (EC) proti lipnicovitým plevelům v cukrovce, krmné řepě, řepce olejce, hrachu suchém i čerstvém zeleném, slunečnici, fazolu suchém, fazolu zeleném čerstvém, zelených fazolích, lnu setém, bramborách, brukvovité zelenině, jahodách a v hybridech kukuřice tolerantních vůči cykloxydimu. Přípravek je dále povolen k menšinovému použití do špenátu a celeru bulvového.

Pouze pro profesionální uživatele.

Účinná látka:

cykloxydim 100 g/l (10,8% hmot.)

Název nebezpečných látek:

solventní nafta (ropná), těžká aromatická



NEBEZPEČÍ

H304 PŘI POŽITÍ A VNIKNUTÍ DO DÝCHACÍCH CEST MŮŽE ZPŮSOBIT SMRT.

H315 DRÁŽDÍ KŮŽI.

H319 ZPŮSOBUJE VÁŽNÉ PODRÁŽDĚNÍ OČÍ.

H336 MŮŽE ZPŮSOBIT OSPALOST NEBO ZÁVRATĚ.

H361D PODEZŘENÍ NA POŠKOZENÍ PLODU V TĚLE MATKY.

H411 TOXICKÝ PRO VODNÍ ORGANISMY, S DLOUHODOBÝMI ÚČINKY.

P202 NEPOUŽÍVEJTE, DOKUD JSTE SI NEPŘEČETLI VŠECHNY BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A NEPOROZUMĚLI JIM.

P261 ZAMEZTE VDECHOVÁNÍ PAR/AEROSOLŮ.

P280 POUŽÍVEJTE OCHRANNÉ RUKAVICE/OCHRANNÝ ODĚV / OCHRANNÉ BRÝLE / OBLIČEJOVÝ ŠTÍT.

P301 + P310 PŘI POŽITÍ: OKAMŽITĚ VOLEJTE TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / LÉKAŘE.

P331 NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ.

P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: OMYJTE VELKÝM MNOŽSTVÍM VODY.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: NĚKOLIK MINUT OPATRNĚ VYPLACHUJTE VODOU. VYJMĚTE KONTAKTNÍ ČOČKY, JSOU-LI NASAZENY, A POKUD JE LZE VYJMOUT SNADNO. POKRAČUJTE VE VYPLACHOVÁNÍ.

P391 UNIKLÝ PRODUKT SEBERTE.

P501 ODSTRANĚTE OBSAH / OBAL PŘEDÁNÍM OPRÁVNĚNÉ OSOBY.

EUH401 DODRŽUJTE POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ, ABYSTE SE VYVAROVALI RIZIK PRO LIDSKÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.

**SP 1 NEZNEČIŠŤUJTE VODY PŘÍPRAVKEM NEBO JEHO OBALEM.
(NEČISTĚTE APLIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ V BLÍZKOSTI POVRCHOVÝCH VOD/ZABRAŇTE KONTAMINACI VOD SPLACHEM Z FAREM A Z CEST).**

Držitel rozhodnutí o povolení: BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38, 67056 Ludwigshafen, Německo

Právní zástupce v ČR: BASF spol. s r.o., Sokolovská 668/136d, 186 00 Praha 8
+ 420 235 000 111

Osoba odpovědná za konečné balení a označení nebo za konečné označení přípravku na ochranu rostlin na trhu: BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38, 67056 Ludwigshafen, Německo

Evidenční číslo přípravku: **3735-1**

Datum výroby: uvedeno na obalu

Číslo šarže: uvedeno na obalu

2D kód: uvedeno na obalu

Doba použitelnosti přípravku: 2 roky od data výroby; teplota skladování +5 až +30 °C

Velikost a materiál balení: 150 ml; 250 ml; 500 ml a 1l přípravku / HDPE/PA láhev se šroubovým uzávěrem

3 l; 5 l; 10 l přípravku / HDPE/PA kanystř se šroubovým uzávěrem

Přípravek, u něhož prošla doba použitelnosti, lze uvádět na trh po dobu 1 roku, jestliže se prokáže na základě analýzy odpovídajícího vzorku, že se jeho chemické a fyzikální vlastnosti shodují s vlastnostmi, na jejichž základě bylo uděleno povolení. Laboratorní rozbory přípravku pro tento účel zajistí držitel povolení u laboratoře akreditované v členském státě Evropské unie. Držitel povolení je povinen prodlouženou dobu použitelnosti vyznačit na obalu přípravku a tuto skutečnost oznámit Ústavu do 5 dnů ode dne provedení změny na obalu přípravku.

Působení:

Stratos® Ultra je selektivní systémový herbicid, jehož účinná látka je přijímána zelenými nadzemními částmi rostlin. Účinnost je nezávislá na druhu a vlhkosti půdy.

V době ošetření mají být plevelné rostliny v plném růstu a vyvinuty tak, aby měly dostatek zelené hmoty pro přijetí potřebného množství účinné látky.

Účinnost se projeví již za 3 - 4 dny po ošetření žloutnutím mladších listů, kde je také patrná tvorba antokyanů. Postupně od mladších listů se šíří nekrózy až do špiček a rostliny odumírají.

Stratos® Ultra prokázal velmi dobrou účinnost na více než 50 druhů jednoletých i víceletých lipnicovitých plevelů.

Rozsah povoleného použití:

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL (dny)	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
fazol suchý	plevele lipnicovité jednoleté	1-2 l/ha nebo 1 l/ha + DASH HC 1 l/ha (TM)	56	1) od: 12 BBCH, do: 39 BBCH 2) postemergentně	
fazol suchý	plevele lipnicovité vytrvalé, pýr plazivý	4 l/ha nebo 2 l + 2 l DASH HC	56	1) od: 12 BBCH, do: 39 BBCH 2) postemergentně	
fazole zelené čerstvé	plevele lipnicovité jednoleté	1-2 l/ha nebo 1 l/ha + DASH HC 1 l/ha (TM)	28	1) od: 12 BBCH, do: 39 BBCH 2) postemergentně	
fazole zelené čerstvé	plevele lipnicovité vytrvalé, pýr plazivý	4 l/ha nebo 2 l/ha + 2 l/ha DASH HC (TM)	28	1) od: 12 BBCH, do: 39 BBCH 2) postemergentně	
kapusta, kapusta růžičková, zelí čínské	plevele lipnicovité jednoleté	1-2 l/ha nebo 1 l/ha + 1 l/ha DASH HC (TM)	42	1) od: 13 BBCH, do: 35 BBCH 2) postemergentně	
kapusta, kapusta růžičková, zelí čínské	plevele lipnicovité vytrvalé, pýr plazivý	4 l/ha nebo 2 l/ha + 2 l/ha DASH HC (TM)	42	1) od: 13 BBCH, do: 35 BBCH 2) postemergentně	
květák, zelí hlávkové	plevele lipnicovité jednoleté	1-2 l/ha nebo 1 l/ha + 1 l/ha DASH HC (TM)	28	1) od: 13 BBCH, do: 35 BBCH 2) postemergentně	
květák, zelí hlávkové	plevele lipnicovité vytrvalé, pýr plazivý	4 l/ha nebo 2 l/ha + 2 l/ha DASH HC (TM)	28	1) od: 13 BBCH, do: 35 BBCH 2) postemergentně	
kukuřice pouze hybridy tolerantní k cykloxydimu	plevele lipnicovité jednoleté	1-2 l/ha nebo 1 l/ha + 1 l/ha DASH HC (TM)	28	1) od: 12 BBCH, do: 19 BBCH 2) postemergentně	
kukuřice pouze hybridy tolerantní k cykloxydimu	plevele lipnicovité vytrvalé, pýr plazivý	4 l/ha nebo 2 l/ha + 2 l/ha DASH HC (TM)	28	1) od: 12 BBCH, do: 19 BBCH 2) postemergentně	
len setý	plevele lipnicovité jednoleté	1-2 l/ha nebo 1 l/ha + 1 l/ha DASH HC (TM)	AT	1) od: 12 BBCH, do: 39 BBCH 2) postemergentně	
len setý	plevele lipnicovité vytrvalé, pýr plazivý	4 l/ha nebo 2 l/ha + 2 l/ha DASH HC (TM)	AT	1) od: 12 BBCH, do: 39 BBCH 2) postemergentně	

řepka olejka	plevele lipnicovité jednoleté	1-2 l/ha nebo 1 l/ha + 1 l/ha DASH HC (TM)	AT	1) od: 12 BBCH, do: 32 BBCH 2) postemergentně	
řepka olejka	plevele lipnicovité vytrvalé, pýr plazivý	4 l/ha nebo 2 l/ha +2 l/ha DASH HC (TM)	AT	1) od: 12 BBCH, do: 32 BBCH 2) postemergentně	
hrách suchý	plevele lipnicovité jednoleté	1-2 l/ha nebo 1 l/ha +1 l/ha DASH HC (TM)	56	1) od: 12 BBCH, do: 39 BBCH 2) postemergentně	
hrách suchý	plevele lipnicovité vytrvalé, pýr plazivý	4 l/ha nebo 2 l/ha +2 l/ha DASH HC (TM)	56	1) od: 12 BBCH, do: 39 BBCH 2) postemergentně	
hrášek zelený čerstvý	plevele lipnicovité jednoleté	1-2 l/ha nebo 1 l/ha +1 l/ha DASH HC (TM)	35	1) od: 12 BBCH, do: 39 BBCH 2) postemergentně	
hrášek zelený čerstvý	plevele lipnicovité vytrvalé, pýr plazivý	4 l/ha nebo 2 l/ha +2 l/ha DASH HC (TM)	35	1) od: 12 BBCH, do: 39 BBCH 2) postemergentně	
brambor	plevele lipnicovité jednoleté	1-2 l/ha nebo 1 l/ha +1 l/ha DASH HC (TM)	56	1) od: 10 BBCH, do: 39 BBCH 2) postemergentně	
brambor	plevele lipnicovité vytrvalé, pýr plazivý	4 l/ha nebo 2 l/ha +2 l/ha DASH HC (TM)	56	1) od: 10 BBCH, do: 39 BBCH 2) postemergentně	
jahodník	plevele lipnicovité jednoleté	1-2 l/ha nebo 1 l/ha +1 l/ha DASH HC (TM)	42	1) od: 11 BBCH, do: 16 BBCH 2) postemergentně	5) pole
jahodník	plevele lipnicovité vytrvalé, pýr plazivý	4 l/ha nebo 2 l/ha +2 l/ha DASH HC (TM)	42	1) od: 11 BBCH, do: 16 BBCH 2) postemergentně	5) pole
cukrovka, řepa krmná	plevele lipnicovité jednoleté	1-2 l/ha nebo 1 l/ha +1 l/ha DASH HC (TM)	AT	1) od: 12 BBCH, do: 39 BBCH 2) postemergentně	
cukrovka, řepa krmná	plevele lipnicovité vytrvalé, pýr plazivý	4 l/ha nebo 2 l/ha + 2 l/ha DASH HC (TM)	AT	1) od: 12 BBCH, do: 39 BBCH 2) postemergentně	
slunečnice	plevele lipnicovité jednoleté	1-2 l/ha nebo 1 l/ha + 1 l/ha DASH HC (TM)	AT	1) od: 12 BBCH, do: 19 BBCH 2) postemergentně	
slunečnice	plevele lipnicovité vytrvalé, pýr plazivý	4 l/ha nebo 2 l/ha + 2 l/ha DASH HC (TM)	AT	1) od: 12 BBCH, do: 19 BBCH 2) postemergentně	

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní.

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní

Plodina, oblast použití	Dávka vody	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině
jahodník	200-300 l/ha	postřik	1x za rok, meziřádkově během vegetace nebo po sklizni
brambor, cukrovka, fazol, hrách, kapusta, kapusta růžičková, květák, len setý, řepa krmná, řepka olejka, slunečnice, zelí čínské, zelí hlávkové	200-300 l/ha	postřik	max. 1x
kukuřice	100-300 l/ha	postřik	max. 1x

Spektrum plevelů:

Plevelé citlivé: oves hluchý, psárka rolní, ježatka kuří noha, chundelka metlice, béry, sveřepy, rosička krvavá, rosička brvitá, troskut prstnatý, milička lipnicovitá, prosa, čirok halepský, pýr plazivý, jílek vytrvalý, a výdroly obilnin - žito seté, ječmen ozimý a jarní, oves setý, pšenice ozimá a jarní, kukuřice

Plevelé méně citlivé: lipnice roční, luční a obecná, sveřep obilní (stoklasa)

Hubení jednoletých travovitých plevelů včetně výdrolu obilnin

Postřik se řídí růstovou fází plevelných trav. Jednoleté lipnicovité plevelé se hubí od fáze prvního listu až do odnožování. Optimální termín ošetření je v době, kdy je většina vzešlých plevelů ve fázi dvou listů až do fáze počátku odnožování. Při pozdější aplikaci je třeba použít horní hranici doporučené dávky.

Hubení vytrvalých travovitých plevelů

Postřik se provádí v době, kdy vytrvalé trávy mají dostatek zelené plochy pro přijetí účinné látky herbicidu. Nejpriznivější účinek je při výšce porostu plevelných trav:

Pýr plazivý (3-5 listů) 15 - 20 cm

Čirok halepský 20 - 30 cm

Troskut prstnatý 10 - 15 cm

Jarní aplikace v ozimé řepce: Ošetření se provádí v době do zakrytí řádků řepkou, nejlépe v období, kdy je obrostlá většina oddenků pýru plazivého.

Nelze vyloučit příznaky fytoxicity na ošetřovaných hybridech kukuřice-tolerantní k cykloxydimu.

Při zpracování sklizně nelze vyloučit negativní vliv přípravku na fermentační procesy ošetřované kukuřice.

Následné a náhradní plodiny:

Pěstování následných plodin je bez omezení.

Dvouděložné plodiny mohou být pěstovány jako plodiny náhradní.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Přípravek nelze použít v množitelských porostech kukuřice.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	bez redukce	tryska 50 %	tryska 75 %	tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]				
Fazole, kapusta, růžičková kapusta, čínské zelí, květák, hlávkové zelí, kukuřice, len setý, řepka olejka, hrách, brambory, jahody, cukrovka, krmná řepa, slunečnice	5	5	0	0

Další omezení:**PŘÍPRAVEK JE VYLOUČEN Z POUŽITÍ V OCHRANNÉM PÁSMU II. STUPNĚ ZDROJŮ POVRCHOVÉ VODY.**

Přípravu aplikační kapaliny (postřikové jíchy) provádějte ve venkovních prostorách s dostatečným přísunem čerstvého vzduchu.

Po ukončení práce opusťte ošetřované prostory!

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob.

Opětovný vstup na ošetřený pozemek je možný minimálně až druhý den po aplikaci.

Při práci i po ní, až do odložení osobních ochranných pracovních prostředků a do důkladného umytí nejezte, nepijte a nekuřte.

Pokud není používán ochranný oděv pro jedno použití, pak ochranný oděv vyperte a OOPP očistěte.

Při přípravě aplikační kapaliny ani při provádění postřiku nepoužívejte kontaktní čočky.

Práce s přípravkem je zakázána pro těhotné a kojící ženy a pro mladistvé.

Čištění aplikačního zařízení:

1. Po vyprázdnění nádrže vypláchněte nádrž, ramena a trysky čistou vodou (čtvrtinou nádrže objemu postřikovače).
2. Vypusťte oplachovou vodu a celé zařízení znovu propláchněte čistou vodou (čtvrtinou nádrže objemu postřikovače).
3. Opakujte postup podle návodu "2" ještě jednou.
4. Trysky a sítko musejí být čištěny odděleně před zahájením a po ukončení proplachování.

Přípravek lze použít samostatně nebo v kombinaci se smáčedlem DASH HC.

Bezpečnostní opatření:

Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) při přípravě a čištění aplikačního zařízení:

Ochrana dýchacích orgánů	není nutná
Ochrana rukou	gumové nebo plastové rukavice označené piktogramem pro chemická nebezpečí podle ČSN EN 420+A1 s uvedeným kódem podle přílohy A k ČSN EN ISO 374-1
Ochrana očí a obličeje	ochranné brýle nebo ochranný štít podle ČSN EN 166
Ochrana těla	celkový ochranný oděv např. podle ČSN EN 14605+A1 nebo podle ČSN EN 13034+A1, nebo jiný ochranný oděv označený grafickou značkou „ochrana proti chemikáliím“ podle ČSN EN ISO 13688

	při ředění přípravku gumová nebo plastová zástěra
Dodatečná ochrana hlavy	není nutná
Dodatečná ochrana nohou	pracovní nebo ochranná obuv (např. gumové nebo plastové holínky) podle ČSN EN ISO 20346 nebo ČSN EN ISO 20347 (s ohledem na práci v zemědělském terénu)
Společný údaj k OOPP	poškozené OOPP (např. protřžené rukavice) je třeba urychleně vyměnit.

Je-li pracovník při vlastní aplikaci dostatečně chráněn v uzavřené kabině řidiče, OOPP nejsou nutné. Musí však mít přichystané alespoň rezervní rukavice pro případ poruchy zařízení.



První pomoc:

Všeobecné pokyny: VŽDY při požití, projeví-li se přetrvávající zdravotní potíže (podráždění kůže, slzení, zarudnutí, pálení očí, nevolnost apod.), nebo v případě pochybností urychleně kontaktujte lékaře.

První pomoc při nadýchání aerosolu při aplikaci: Přerušete expozici. Přejděte mimo ošetřovanou oblast. Zajistěte tělesný i duševní klid.

První pomoc při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný / nasáklý oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou s mýdlem, pokožku následně dobře opláchněte.

První pomoc při zasažení očí: Odstraňte kontaktní čočky, pokud je používáte, současně vyplachujte oči alespoň 10 minut velkým množstvím vlažné tekoucí čisté vody. Kontaktní čočky nelze znova použít, je třeba je zlikvidovat.

První pomoc při náhodném požití: NIKDY nevyvolávejte zvracení. Ústa vypláchněte vodou (pouze je-li postižený při vědomí). OKAMŽITĚ vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte štítek popř. obal přípravku nebo bezpečnostní list.

Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým se pracovalo, poskytněte mu informace ze štítku, etikety nebo příbalového letáku a o poskytnuté první pomoci. Další postup první pomoci (i event. následnou terapii) lze konzultovat s **Toxikologickým informačním střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.**

Skladování:

Přípravek se skladuje v uzavřených originálních obalech v suchých uzamykatelných skladech při teplotách +5 až +30 °C odděleně od potravin, nápojů a krmiv, hnojiv, desinfekčních prostředků a obalů od těchto látek. Chraňte před mrazem, přímým slunečním zářením a sáláním tepelných zdrojů.

Při správném skladování v původních neotevřených obalech přípravek zachová plnou biologickou účinnost po dobu nejméně 2 let. Pečlivými zkouškami bylo prokázáno, že při dodržení návodu k použití je přípravek vhodný k doporučenému účelu. Výrobce však nemůže ručit za škody, způsobené neodborným a předpisům neodpovídajícím použitím a skladováním.

Likvidace obalů a zbytků:

Při likvidaci zbytků a použitých obalů nesmějí být zasaženy zdroje spodních vod a recipienty povrchových vod. Prázdné obaly od přípravku několikrát vypláchněte vodou, která se nesmí vylévat a použije se pro přípravu postřiku. Obaly poté dejte buď do sběru k recyklaci nebo k likvidaci ke spálení ve schválené spalovně, vybavené dvoustupňovým spalováním s teplotou 1200 - 1400°C ve druhém stupni a s čištěním plynných zplodin. Stejně se spálí případné zbytky přípravku po předchozím smícháním s hořlavým materiálem (pilinami apod.). Zbytky postřikové kapaliny zředěné v poměru asi

1:5 likvidujte vystřikáním na okraji ošetřeného pozemku v místě vzdáleném od vodotečí, studní a rybníků.

Aplikační doporučení BASF:

POZOR! Ošetření přípravkem Focus® Ultra je možné pouze u hybridu, u nichž šlechtitelé deklarují toleranci vůči cykloxydimu. Všechny ostatní hybridy jsou přípravkem likvidovány!

Focus® Ultra se používá v ošetřovaných plodinách po vzejití lipnicovitých plevelů. Termín ošetření se řídí především růstovou fází plevelů, méně už růstovou fází kulturní plodiny.

Teplé a vlhké počasí nebo příznivé růstové podmínky účinnost urychlují, sucho a nízké teploty ji naopak zpomalují. V oblastech s vysokou světelnou intenzitou je vhodnější ošetřovat v podvečerní době.

® registrovaná známka BASF

Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL (dny)	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
špenát	plevele lipnicovité jednoleté	1-2 l/ha	28	1) od: 12 BBCH, do: 19 BBCH 2) postemergentně	5) pole
špenát	pýr plazivý, plevle lipnicovité vytrvalé	4 l/ha	28	1) od: 12 BBCH, do: 19 BBCH 2) postemergentně	5) pole
celer bulvový	plevele lipnicovité jednoleté	2,5 l/ha	35	1) od: 11 BBCH 2) postemergentně	5) pole
celer bulvový	pýr plazivý, plevle lipnicovité vytrvalé	5 l/ha	35	1) od: 11 BBCH 2) postemergentně	5) pole

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití	Dávka vody	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině
celer bulvový	150-600 l/ha	postřik	1x
špenát	200-300 l/ha	postřik	1x

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů.

Plodina	bez redukce	tryska 50 %	tryska 75 %	tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]				
celer bulvový	5	0	0	0
špenát	5	5	0	0

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody při aplikaci ve špenátu.

Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.

Přípravek může být používán pouze profesionálním uživatelem dle ust. § 2 odst. 2 písm. h) zákona č. 326/2004 Sb., v platném znění.

Rizika spojená s nedostatečnou účinností přípravku nebo jeho případnou fytotoxicitou nese ve smyslu ust. čl. 51 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 výlučně osoba používající přípravek.